

BACCALAURÉAT
SESSION 2025

Durée : 4 h
Coefficient : 4

MATHÉMATIQUES

SÉRIE D

Cette épreuve comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3 et 3/3.
Toute calculatrice scientifique est autorisée.

EXERCICE 1 (2 points)

Écris, le numéro de chacun des énoncés ci-dessous suivi de VRAI si l'énoncé est vrai ou de FAUX si l'énoncé est faux.

1. u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle K . r est un élément de $\mathbb{Q}^* \setminus \{1\}$.
Une primitive sur K de la fonction $\frac{u'}{u^r}$ est la fonction $\frac{-1}{(r-1)u^{r-1}}$.
2. Quel que soit le nombre réel a strictement positif, $\ln(\sqrt[3]{a}) = 3\ln a$.
3. Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω muni d'une probabilité P .
La fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = P(X > x)$ est la fonction de répartition de X .
4. Pour tous p élément de $\mathbb{Z}^*$, q élément de $\mathbb{N}^*$ et x un élément de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, $x^{\frac{p}{q}} = \left(x^{\frac{1}{q}}\right)^p$.

EXERCICE 2 (2 points)

Pour chacun des énoncés ci-dessous, les informations a , b , c et d permettent d'obtenir quatre affirmations dont une seule est vraie.

Écris le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de l'information qui donne l'affirmation vraie.

1. z est un nombre complexe de module 4. Le conjugué de z est égal à...
a) $\frac{1}{4z}$; b) $\frac{4}{z}$; c) $\frac{1}{16z}$; d) $\frac{16}{z}$.
2. La forme trigonométrique du nombre complexe $-\sqrt{3} + i$ est...
a) $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$; b) $2(\cos \frac{-\pi}{6} + i \sin \frac{-\pi}{6})$; c) $2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$; d) $2(\cos \frac{-5\pi}{6} + i \sin \frac{-5\pi}{6})$.
3. L'intégrale $\int_1^e (\ln x + 1) dx$ est égal à ...
a) $2e$; b) $e + 1$; c) e ; d) $e - 1$.
4. L'image de 4 par le prolongement par continuité g de la fonction f définie sur $[0 ; 4[$ par :
 $f(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{x^2-16}$ est ...
a) 0 ; b) $\frac{1}{8}$; c) $\frac{1}{16}$; d) $\frac{1}{32}$.

EXERCICE 3 (3 points)

Soit le polynôme P défini dans $\mathbb{C}$, par : $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i$.

1. Calcule $P(i)$.
2. Vérifie que : $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = (z - i)[z^2 - (3 + i)z + 2 + i]$.
3. Vérifie que $1 + i$ est une racine carrée de $2i$.
4. Résous dans $\mathbb{C}$, l'équation : $P(z) = 0$.

EXERCICE 4 (3 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \end{cases}$$

On admet que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$.

1. a) Démontre que la suite (u_n) est croissante.
b) Déduis-en que la suite (u_n) est convergente.
2. Soit la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{2x+1}{x+2}$.
a) Démontre que : $\forall x \in [0; 1], |f'(x)| \leq \frac{3}{4}$.
b) En utilisant l'inégalité des accroissements finis, démontre que :
$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1|.$$

c) Démontre par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
d) Déduis-en la limite de la suite (u_n) .

EXERCICE 5 (5 points)

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{e^x - 1}$.

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) d'unité graphique 2 cm.

(D) est la droite d'équation : $y = 2x - 1$.

1. a) Calcule la limite de f en 0.
b) Calcule la limite de f en $+\infty$.
2. On admet que f est dérivable sur $]0; +\infty[$.
a) Démontre que : $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{(2e^x - 1)(e^x - 2)}{(e^x - 1)^2}$.
b) Déduis-en que f est strictement décroissante sur $]0; \ln 2[$ et strictement croissante sur $] \ln 2; +\infty[$.
c) Dresse le tableau de variation de f .

3. a) Justifie que $(\mathcal{C})$ est au-dessus de (D) sur $]0; +\infty[$.

b) Vérifie que : $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$.

c) k désigne un nombre réel supérieur ou égal à 2.

On désigne par $A(k)$ l'aire en cm^2 du domaine limité par $(\mathcal{C})$, la droite (D) et les droites d'équations $x = \ln 2$ et $x = \ln k$.

Démontre que : $A(k) = 4\left[\ln 2 + \ln\left(\frac{k-1}{k}\right)\right] \text{ cm}^2$.

d) Calcule : $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k)$.

EXERCICE 6

(5 points)

A l'occasion d'une journée récréative, un groupe d'élèves de Terminale D, organise une loterie dans laquelle une mise en francs CFA est demandée avant de jouer.

Le jeu consiste à tirer simultanément deux boules dans une urne qui en contient six, toutes indiscernables au toucher, dont 2 blanches, 3 noires et une verte.

Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il ne reçoit rien.

Si le joueur obtient deux boules noires, il reçoit 500 francs CFA.

Si le joueur obtient deux boules blanches, il reçoit le double de sa mise.

Les organisateurs voudraient connaître le montant minimal à fixer comme mise pour espérer ne pas perdre dans ce jeu.

Ne sachant comment s'y prendre, ils te sollicitent.

A l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, apporte une réponse à la préoccupation des organisateurs de cette loterie.

DIRECTION DES EXAMENS ET CONCOURS

SOUS-DIRECTION DES EXAMENS SCOLAIRES

SERVICE BACCALAUREAT

BACCALAUREAT – SESSION 2025

ÉPREUVE : ...M.A.T.H.E.M.A.T.I.Q.U.E.S..... DATE : 17/06/2025.. HEURE :

CORRIGE ET BAREME

SÉRIE(S) :

D

CORRIGE

BAREME

Ce barème est national, il ne peut être modifié. Certaines réponses ont été données à titre indicatif.

Cependant, toute autre démarche correcte sera acceptée. Le correcteur devra tenir compte de la démarche qui conduit au résultat.

A un résultat correct non justifié ou incorrectement justifié, on accordera la moitié des points, sauf si la question est notée sur 0,25.

Dans ce cas, on attribuera la note 00 (zéro).

Pour l'exercice 6, le correcteur doit attribuer les points en fonction des indicateurs et non à chaque résultat.

Le critère de perfectionnement (CP) est à appliquer à l'ensemble de la production de l'exercice 6.

CORRIGE

BAREME

Exercice 1 (2 points)

1- VRAI 2- FAUX 3- FAUX 4- VRAI

0,5 x 4

Exercice 2 (2 points)

1- d 2- C 3- C 4- d

0,5 x 4

Exercice 3 (3 points)

1- $P(i) = 0$ — — — — —

0,5

2- Vérification correcte de

$$P(z) = (z-i)[z^2 - (3+i)z + 2+i]$$

0,5

3- $(1+i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ — —
ou autre méthode

0,5

4-

$$P(z) = 0 \Leftrightarrow z-i=0 \text{ ou } z^2 - (3+i)z + 2+i = 0$$

0,25

$$\Delta = 2i$$

0,5

$$z_1 = 1 ; z_2 = 2+i$$

0,25 x 2

$$S_C = \{i ; 1 ; 2+i\}$$

0,25

Exercice 4

$$1-a) \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2}$$

$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$, d'où :

$$u_n + 2 > 0 \text{ et } 1 - u_n^2 \geq 0$$

CORRIGE

BAREME

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n \geq 0.$$

D'où (u_n) est croissante. — — —

b) (u_n) est croissante et majorée
(par 1), donc elle est convergente. — — —

$$2-a) \quad \forall x \in [0; 1], \quad f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2} \text{ — — —}$$

$$\text{On obtient : } \frac{1}{3} \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}.$$

$$\text{Donc : } |f'(x)| \leq \frac{3}{4}. \text{ — — —}$$

b) En utilisant l'inégalité des accroissements
finis sur $[0; 1]$, avec $u_n \in [0; 1]$
et $1 \in [0; 1]$, on obtient :

$$|f(u_n) - f(1)| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1|$$

$$\text{Donc : } |u_{n+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_n - 1| \text{ — — —}$$

c) Raisonnement par récurrence

$$|u_0 - 1| = 1 \quad \text{et} \quad \left(\frac{3}{4}\right)^0 = 1.$$

$$\text{On a : } 1 \leq 1, \quad \text{d'où} \quad |u_0 - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^0$$

Supposons que pour un entier naturel k ($k \geq 0$),

$$\text{on a : } |u_k - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

$$\frac{3}{4} |u_k - 1| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{k+1}$$

$$\text{D'après 2-b), on a : } |u_{k+1} - 1| \leq \frac{3}{4} |u_k - 1|$$

<u>Exercice 5</u> (5 points)													
1- a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ — — — —	0,5												
b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ — — — —	0,5												
2- a) $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = 2 - \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}$ — — — —	0,5												
— $-\frac{(2e^x - 1)(e^x - 2)}{(e^x - 1)^2}$ — — — —	0,25												
b) Justification correcte du signe de la dérivée													
$\begin{cases} \forall x \in]0; \ln 2[, f'(x) < 0 \\ \forall x \in]\ln 2; +\infty[, f'(x) > 0 \end{cases}$ — — — —	0,5												
Déduction du sens de variation de f. — — — —	0,25												
c) <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>$\ln 2$</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td></td><td>— 0 +</td><td></td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td></td><td>$+\infty$</td></tr> </table> — — — —	x	0	$\ln 2$	$+\infty$	$f'(x)$		— 0 +		$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$	0,25
x	0	$\ln 2$	$+\infty$										
$f'(x)$		— 0 +											
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$										

CORRIGE

BAREME

3-a) $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) - (2x-1) = \frac{1}{e^x - 1}$ —

0,25

$\forall x > 0, e^x - 1 > 0, \text{ d'où } f(x) - (2x-1) > 0$ —

0,25

Donc (C) est au-dessus de (D) sur $]0; +\infty[$.

b) Vérification correcte de :

$\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = 2x - 2 + \frac{e^x}{e^x - 1}$

0,5

c) $A(k) = \int_{\ln 2}^{\ln k} [f(x) - (2x-1)] dx \times VA$ —

0,25

$= \int_{\ln 2}^{\ln k} \left[-1 + \frac{e^x}{e^x - 1} \right] dx \times 4 \text{ cm}^2$ —

0,25

$= \left[-x + \ln(e^x - 1) \right]_{\ln 2}^{\ln k} \times 4 \text{ cm}^2$ —

0,25

$= 4 \left[\ln 2 + \ln \left(\frac{k-1}{k} \right) \right] \text{ cm}^2$ — —

0,25

d) $\lim_{k \rightarrow +\infty} A(k) = 4 \ln 2 \text{ cm}^2$ — —

0,25

Exercice 6 (5 points)

Réponse attendue

Pour apporter une réponse à la préoccupation des organisateurs, je vais utiliser la leçon : Probabilité conditionnelle et variable aléatoire.

Pour cela, je vais :

- utiliser la variable aléatoire qui est égale au gain algébrique du joueur et donner ses valeurs;
- déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire;

CORRIGE

BAREME

- Calculer son espérance mathématique en fonction de la mise;
- poser que l'espérance mathématique est inférieure ou égale à 0 et résoudre une inéquation.

Soit m la valeur de la mise.

X est la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur. Les valeurs de X sont : $-m$; $500-m$ et m .

Loi de probabilité de X

x_i	$-m$	$500-m$	m
$p(X=x_i)$	$\frac{11}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{1}{15}$

* Calculons $E(X)$

$$E(X) = \frac{1500 - 13m}{15}$$

$$* E(X) \leq 0 \Rightarrow m \geq 115,3.$$

Donc le montant minimal à fixer comme mise pour que les organisateurs ne perdent pas à ce jeu est 120 francs CFA (On acceptera 116 francs CFA).

CORRIGE

BAREME

BAREME CRITERIE

CRITERES	INDICATEURS	BAREME
CM1 : Pertinence Identification du modèle correspondant au problème posé	* Je vais utiliser la leçon : Probabilité conditionnelle et variable aléatoire Pour cela, je vais : * utiliser une variable aléatoire et donner ses valeurs ; * déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire ; * Calculer son espérance mathématique en fonction de la mise ; * poser que l'espérance mathé- matique est inférieure ou égale à zéro et résoudre une inéquation .	0,75 pt 1 ind sur 5 → 0,25 2 ind sur 5 → 0,5 3 ind sur 5 → 0,75 Règle de 2/3 $\frac{2}{3} \times 5 = 3,33$ arrondi à 3
CM2 : Utilisation correcte des outils mathématiques en situation	* X est la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur ; * Présence des valeurs de X : - m ; 500 - m ; m (m désigne la mise) ; * présence du calcul de $E(X)$ $E(X) = \frac{4500 - 13m}{15}$	2,5 pts 1 ind sur 6 → 0,75 2 ind sur 6 → 1,5 3 ind sur 6 → 2

	CORRIGE	BAREME
	* poser $E(X) \leq 0$;	4 ind sur 6 → 2,5
	* résoudre l'inéquation : $E(X) \leq 0$.	Règle de 2/3 $\frac{2}{3} \times 6 = 4$
CM3 :	* Le résultat produit est conforme au résultat attendu (La valeur de $E(X)$ calculée est juste)	1,25 pts.
Cohérence de la réponse	* Le résultat produit est en adéquation avec la démarche (formules justes même si le modèle est faux)	1 ind sur 4 → 0,5
		2 ind sur 4 → 1
		3 ind sur 4 → 1,25
	* La qualité des enchaînements de la démarche	
		Règle des 2/3
	* La Conclusion (la valeur minimale de la mise est de 120 francs CFA (ou 116 francs CFA)	$\frac{2}{3} \times 4 = 2,66...$ arrondi à 3
CP (Concision, originalité, bonne présentation)	* Propriété de la production (Présence de titres des étapes, pas de rature et de surcharge)	0,5 pts
		1 ind sur 3 → 0,25
	* Démarche non classique au-delà de la production attendue	2 ind sur 3 → 0,5
	* Production juste en peu de mots (esprit de synthèse)	Règle des 2/3 $\frac{2}{3} \times 3 = 2$